

Na de operatie

Pijn

In geval van pijn mag u paracetamol innemen (GEEN aspirine).

Zwelling

Als u thuis komt, is het goed om de oogleden af te koelen met een ijsbril (zoals diepgevroren erwten of ijsblokjes gehuld in een plastic zak met een handdoek eromheen). Dit mag u een paar keer herhalen de dag zelf en de volgende dag. De eerste dag wordt elk uur 15 minuten aangeraden. Ooglidzwelling en blauwe verkleuring zijn de eerste dagen het ergst (vooral de 2e en 3e dag). Deze nemen af in de volgende 2 weken.

Wondverzorging

Een korst op de wonde en dichtgeplakte wimpers 's ochtends zijn normaal. U kan dit schoonmaken door te deppen met een vochtig oorstokje.

Bloedverduunners

Bloedverdunnende medicatie mag opgestart worden vanaf de dag na de operatie.

Litteken

Zolang het litteken rood is (gemiddeld 2 à 3 maanden), is blootstelling van het litteken aan de zon te vermijden.

1 week na de operatie

Hechtingen worden verwijderd door de oogarts of de huisarts.

Volgende controle

Na 4 à 6 weken komt u terug op controle.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u bij ons terecht op uw volgende consultatie of bij de dienst oogheelkunde in het AZ Jan Palfijn Gent via het nummer 09 224 71 11 (algemeen nummer voor afspraken en inlichtingen).

Bron: zie www.oogheelkunde.org, www.oogartsen.nl en dank aan MMC Eindhoven en Oogziekenhuis Rotterdam



**AZ JAN PALFIJN
GENT**

Dienst Oogziekten:
T +32 (09) 224 87 95

Inlichtingen en afspraken:
T +32 (0)9 224 71 11

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be



**AZ JAN PALFIJN
GENT**



**EEN NAAR BINNEN
OF BUITEN GEDRAID
ONDEROGLID**

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Het goed functioneren van de ogen hangt onder andere af van de positie en functie van de oogleden. De onderoogleden kunnen naar binnen of naar buiten draaien, vooral op oudere leeftijd. Deze afwijking kan irritatie van de ogen en verslechtering van zicht veroorzaken. Dit kan hersteld worden met een operatie.

WAT IS EEN "ECTROPION" ?

Een ectropion is een naar buiten gedraaid onderooglid.

Oorzaak

Met het ouder worden verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor gaat het lager hangen en kantelt het naar buiten. Dit kan ook veroorzaakt worden door littekens of huidziekten.

Klachten

Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind.

Ingrep


Meestal wordt het naar buiten gedraaid ooglid onder **plaatselijke verdoving** behandeld. Het onderooglid wordt daarbij ingekort en met hechtingen weer vastgezet. De hechtingen worden na een week verwijderd.

WAT IS EEN "ENTROPION" ?

Een entropion is een naar binnen gedraaid onderooglid.

Oorzaak

Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering of littekens.



Klachten

Doordat het ooglid naar binnen is gedraaid, wrijven de wimpers tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood geïrriteerd oog. Wanneer het ooglid niet wordt behandeld, is er een risico dat het hoornvlies wordt beschadigd door het schuren van de wimpers. Er kan dan een chronische wonde op het hoornvlies ontstaan.

Ingrep

Meestal wordt het naar binnen gedraaid ooglid onder **plaatselijke verdoving** behandeld. Doel van de ingrep is om de wimpers terug in de normale positie te kunnen brengen. Er wordt een insnede gemaakt net onder de wimpers van het onderooglid. De spier wordt opgezocht en terug op de normale positie gehecht. Als het onderooglid erg slap is, wordt het ook ingekort.

Er wordt gestreefd naar een overcorrectie, dit wil zeggen dat de wimpers in het begin te veel naar buiten staan. Uit ervaring weet men dat het ooglid spontaan terug een beetje naar binnen draait.

De huid wordt gehecht met hechtingen die na één week verwijderd worden.

COMPLICATIES OF RISICO'S

Soms komt het voor dat na de operatie het ooglid niet in de gewenste stand komt. Een tweede ingreep kan dan nodig zijn. Ooglidoperaties zijn in het algemeen niet gevaarlijk. Toch zijn er ook risico's aan verbonden.

Een **blauw oog** komt vaak voor, maar geneest snel (binnen 10 tot 14 dagen).

Een bloeding of infectie treedt zeer zelden op.

Wanneer het oog naar voren komt of het oog zeer slecht gaat zien na de ooglidoperatie, neem dan zo snel mogelijk contact op met de oogarts, of ga direct naar het ziekenhuis.

PRAKTISCH VERLOOP VAN DE OPERATIE EN NAZORG

Vanaf 2 weken voor de operatie

Bloedverdunners worden in overleg met de huisarts gestopt of vervangen.

Dag van de operatie

U neemt uw medicatie nog in zoals gewoonlijk (behalve bloedverdunners). U hebt geen make-up aan.