




AZ JAN PALFIJN
GENT



AZ JAN PALFIJN
GENT

Meer inlichtingen
T +32 (0)9 224 83 33

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

versie folder: mei 2017 - v.u.: Rudy Coddens, voorzitter

ESWL


Niersteenverbrijzeling

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

NIERSTEENVERBRIJZELING

In overleg met de uroloog is besloten om de steen in uw nier of urineleider te behandelen met de niersteenvergruizer.

Bij deze behandeling worden schokgolven op de niersteen gericht waardoor deze tot gruis wordt verpulverd.



In deze folder vindt u meer informatie over deze behandeling, hoe u zich kan voorbereiden en wat u mag verwachten.

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij de uroloog of verpleegkundige.

VOORBEREIDING

- ▶ De behandeling vindt plaats in dagopname, u hoeft dus niet te overnachten in het ziekenhuis.
- ▶ Meld het aan de arts als u bloed verdunnende geneesmiddelen inneemt.
- ▶ Bij zwangerschap, of vermoeden hiervan, wordt de behandeling uitgesteld.
- ▶ Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u 12 uur voor de ingreep niet mag eten, drinken of roken.
- ▶ Eventueel wordt een RX-opname gemaakt om de niersteen op te sporen.

BEHANDELING

- ▶ De behandeling duurt gemiddeld 40 minuten.
- ▶ Tijdens de behandeling ligt u op de tafel van het toestel.
- ▶ Er wordt een gel aangebracht op de huid om contact te maken tussen het lichaam en het toestel.
- ▶ Röntgenfoto's en ultrasone geluidsgolven lokaliseren de steen
- ▶ De schokgolven worden op de steen gericht waardoor deze tot gruis wordt herleid.
- ▶ Blijft tijdens de ingreep zo stil mogelijk liggen en adem rustig in en uit.

De schokgolven kunnen pijn veroorzaken. Meld het aan de arts wanneer de pijn te intens wordt.

NA DE BEHANDELING

- ▶ Na de behandeling blijft u nog ongeveer 1 uur in het ziekenhuis ter observatie. Daarna mag u het ziekenhuis verlaten.
- ▶ Drink geen alcoholische dranken en bestuur geen voertuigen gedurende de eerste 24 uur na de behandeling.
- ▶ U krijgt een zeefje mee naar huis waar u de steentjes die u uitplast in kan opvangen. Breng deze mee naar de volgende controle zodat het labo deze kan analyseren
- ▶ Lichaamsbeweging mag indien mogelijk maar forceer jezelf niet.
- ▶ Drink water met mate.

COMPLICATIES

Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen.

Koliepijn

Uitstralende pijn naar de onderbuik.
Deze pijn kan worden verzacht met pijnstillers.

Bloed in de urine

Dit is niet verontrustend en vermindert spontaan

Neem onmiddellijk contact op met de uroloog in volgende gevallen:

- ▶ Meer dan 38,5° koorts.
- ▶ De pijn verdwijnt niet na inname van pijnstillers.
- ▶ Geen urineproductie hoewel u voldoende heeft gedronken.
- ▶ Aanhoudend bloed in de urine.