



AZ JAN PALFIJN
GENT



AZ JAN PALFIJN
GENT

Borstkliniek

T +32 (0)9 224 84 30

T +32 (0)9 224 84 31

Watersportlaan 5 - 9000 Gent

T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42

info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

versie folder mei 2017 - vu... Rudy Coddens, voorzitter



Hormonale

behandeling van borstkanker

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

HORMONALE BEHANDELING VAN BORSTKANKER

Sommige borstkankers worden behandeld met zogenaamde antihormoonmiddelen. Dit zijn medicijnen die dagelijks via de mond worden ingenomen of injecties die onderhuids worden toegediend.

HORMOONGEVOELIGE BORSTKANKER

Borstkankercellen kunnen door de vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen) gestimuleerd worden om te groeien. In dat geval spreekt men van een 'hormoongevoelige ziekte'.

Of een tumor hormoongevoelig is, wordt nagegaan met een gericht microscopisch onderzoek van het tumorweefsel.

Een antihormoonbehandeling kan zowel in de beginfase van de ziekte worden voorgeschreven, als voor de nabehandeling na een heelkundige ingreep, of in een meer gevorderd ziektestadium.

De antihormoonbehandeling laat de hoeveelheid vrouwelijke hormonen, die van nature in het lichaam aanwezig zijn, dalen (door de remming van de aromatase-enzymen) of zwakt de werking van deze hormonen af (door blokkering van de oestrogeenreceptor op celniveau). Hormoongevoelige kankercellen worden daardoor in hun groei geremd en vernietigd. Zo wordt de kans op herval kleiner en neemt de kans op genezing toe.

Vrouwelijke hormonen worden in de premenopauze door de eierstokken aangemaakt. In de postmenopauze is het vooral het vetweefsel dat voor de productie van deze hormonen instaat, door de werking van de aromatase-enzymen.

Premenopauzale patiënten worden, als bepaalde ziektekenmerken dit nodig maken, soms vroegtijdig in de menopauze gebracht. Dit resulteert in een absolute uitschakeling van hormonale invloeden op resterende kankercellen. De nevenwerkingen bij dit soort aanpak zijn meestal meer uitgesproken. De arts bespreekt met u de mogelijke noodzaak voor dergelijke behandeling. Een patiënte kan tijdelijk (door een maandelijkse injectie) of definitief (heelkundig wegnemen van de eierstokken) menopauzaal gemaakt worden.

Uw arts bespreekt met u welke medicatie voor u het meest geschikt is, hoelang u deze dient in te nemen en of ze na verloop van tijd eventueel dient te worden aangepast.

ANTIHOORMOONBEHANDELING PRAKTISCH

De behandeling start doorgaans na een operatie en valt samen met het begin van de bestraling (als die bij u aangewezen is).

U dient de voorgeschreven medicatie dagelijks, telkens ongeveer op hetzelfde tijdstip, in te nemen met een glas water. Bij voorkeur wordt de behandeling niet onderbroken. Neem daarom altijd enkele tabletten mee en zorg voor een reservevoorschrift.

Uw arts gaat na of u andere medicatie of producten inneemt die de werking van het antihormoonmiddel kunnen beïnvloeden en spoort ook bepaalde neveneffecten proactief op. Dit gebeurt door middel van botdensitometrie, meting van cholesterol en suiker in het bloed, echografie ter controle van het baarmoederslijmvlies.

Als u wordt behandeld met injecties, worden die op maandelijkse basis toegediend door de huisarts, door een thuisverpleegkundige of in het dagziekenhuis.

NEVENEFFECTEN

De verlaagde hormoongehalten of hormooneffecten kunnen normale cellen en lichaamsfuncties beïnvloeden.

Warmteopwellingen, stemmingswisselingen, slape-loosheid en concentratiestoornissen, gewichtstoename, gewrichtslijden en botontkalking kunnen voorkomen. Patiënten melden ook maaglast, haarveranderingen of minder zin in seks (met vaginale droogte en irritatie). Ook effect op het baarmoederslijmvlies en verhoogde kans op bloedklontervorming zijn beschreven.

Hoe jonger u bent, hoe meer uitgesproken deze veranderingen kunnen zijn.

Aarzel niet om de bijwerkingen te bespreken met uw arts. Die kan beslissen om uw behandeling aan te passen of stop te zetten. Hierbij zal de arts het effect van de behandeling afwegen ten opzichte van de invloed op de levenskwaliteit.

Zelf hebt u ook hier ook invloed op: rook niet en streef naar een gezonde levensstijl met gevarieerde voeding en voldoende beweging en ontspanning. Laat overmatig alcoholgebruik achterwege.

ONVERWACHT NEVENEFFECTEN

Bij het plots of onverwacht optreden van neveneffecten of bij pijn of problemen neemt u best contact op met de behandelende arts of oncoverpleegkundige.

Als deze niet bereikbaar zijn kan u het ziekenhuis contacteren via volgende kanalen:

- ▶ 08:00 - 17:00 uur: 09 224 81 11 (Call center)
- ▶ 17:00 - 8:00 uur: 09 224 81 01 (Dienst Spoed)