



AZ JAN PALFIJN
GENT

BEHANDELING MET
VAATGROEIREMMER (ANTI - VEGF):
een intravitreale injectie

1. WAT IS EEN INTRAVITREALE INJECTIE?

Een intravitreale injectie is een inspuiting van een kleine hoeveelheid vloeibare medicatie in het glasvocht van het oog. Deze procedure wordt meermaals uitgevoerd bij een behandeling.

2. ZIEKTEN WAARBIJ INTRAVITREALE INJECTIES MET VAATGROEIREMMERS WORDEN TOEGEPAST EN WAARVOOR OOK TERUGBETALING BESTAAT:

- ▶ Natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie
- ▶ Diabetisch maculair oedeem
- ▶ Maculair oedeem bij veneuze vaatafsluiting
- ▶ Pathologische myopie
- ▶ Andere oorzaken van neovascularisatie

De vaatgroeiremmer remt de groei van de nieuwgevormde, lekkende bloedvaten die ontstaan door de oogziekte. Door de injecties trekt het oedeem, het vocht, weg en kan het zicht mogelijk opnieuw verbeteren.

3. HOE VERLOOPT DEZE INGREEP?

Dit is een ambulante ingreep; een opname is hiervoor dus niet nodig en je hoeft niet nuchter te zijn.

De injectie gebeurt in een ruimte die speciaal werd ingericht voor kleine ingrepen.

- ▶ Tijdens de behandeling ligt de patiënt neer.
- ▶ De verpleging verdooft het oog met verschillende druppels.
- ▶ De huid rond het oog wordt goed ontsmet met een joodoplossing. Daarna wordt ook het oog zelf hiermee ingedruppeld en wordt een steriel oogdoek over het oog gelegd.
- ▶ De oogarts plaatst daarna een ooglidspeder om de oogleden open te houden waardoor je niet kan knippen. Dit spant een beetje.

- ▶ De oogarts injecteert de medicatie met een speciaal spuitje in de oogbol terwijl de patiënt in een bepaalde richting blijft kijken. Deze prik wordt snel toegediend zodat dit maar heel even voelbaar is. Vaak zien patiënten hierna een wolk of belletjes verschijnen, dat is normaal.
- ▶ Na de prik wordt met een wattenstaafje enkele seconden druk uitgeoefend op de injectieplaats.
- ▶ Het oog wordt daarna grondig gespoeld en er wordt een hydraterende gel aangebracht.

4. WAT GEBEURT ER NA DE INGREEP?

- ▶ We raden je aan om na de ingreep even te blijven liggen.
- ▶ Na een kwartiertje kan in het oog een zanderig en schurend gevoel ontstaan. Dit kan enkele uren tot een dag (uitzonderlijk enkele dagen) duren en gaat vanzelf over.
- ▶ Op de injectieplaats ter hoogte van het oogbindvlies kan een kleine, onschuldige bloeding optreden. Deze verdwijnt gedurende de eerste week na de ingreep.

5. THUISBEHANDELING

Je krijgt kunsttranen mee die je meermaals per dag, in functie van de behoefte, in het oog mag druppelen tot het schurende gevoel voorbij is.

6. WAT TE DOEN BIJ BIJKOMENDE KLACHTEN DE EERSTE 2 DAGEN NA DE INGREEP?

Bij volgende klachten moet je onmiddellijk contact opnemen met de dienst oogziekten:

- ▶ Hevige pijn
- ▶ Toenemende vlokken
- ▶ Toenemende roodheid
- ▶ Het zien van bliksems
- ▶ Het zien van een toenemende schaduw

Als de dienst oogziekten niet bereikbaar is of buiten de werkuren, kan je terecht op de spoeddienst (09 224 81 01).

7. WAT ZIJN DE RISICO'S VAN EEN INTRAVITREALE INJECTIE?

De oogarts neemt alle voorzorgen om de risico's tot een minimum te beperken. Intravitreale injecties worden de laatste jaren wereldwijd heel frequent uitgevoerd en complicaties zijn zeldzaam.

Toch zijn volgende ernstige complicaties mogelijk:

- ▶ Een infectie binnen het oog: 0,16%
- ▶ Netvliesloslating: 0,15%
- ▶ Lensschade: 0,07%

Bij ernstige bijwerkingen zijn bijkomende behandelingen en eventueel een ingreep nodig.

Mogelijke minder ernstige bijwerkingen zijn:

- ▶ Een bloeding
- ▶ Oogdrukstijging
- ▶ Reactie op de medicatie

8. KOSTPRIJS VAN EEN INTRAVITREALE BEHANDELING

De indicaties voor een terugbetaalde behandeling zijn de laatste jaren verder uitgebreid waardoor de kost meestal beperkt is.

Indien je aandoening niet onder een terugbetaling valt, licht de oogarts je hierover in.

Af en toe dient voor de diagnose of opvolging een OCT-scan (Optical Coherence Tomography) te gebeuren.

Deze scan wordt 6 maal per jaar terugbetaald door het ziekenfonds. Indien er meer dan 6 scans nodig zijn, worden de bijkomende scans niet terugbetaald. Het ziekenhuis rekent hiervoor 40 euro aan.

Een behandeling met intravitreale injectie bestaat uit meerdere injecties naargelang de aard van de aandoening, doorgaans met een pauze van een paar weken tussen de injecties.

De oogarts heeft je uitgelegd dat er in eerste instantie een reeks van 3 injecties met een tussenpauze van een maand wordt gegeven. Nadien volgt een controleafspraak van je gezichtsscherpte en een OCT-scan om het effect van de behandeling te evalueren. Afhankelijk van het resultaat van de eerste reeks injecties wordt een verdere behandeling voorgesteld.

9. CONTACTGEGEVENS (POLIKLINIEK) OOGZIEKTEN

AZ Jan Palfijn Gent

Watersportlaan 5
9000 Gent

Dienst oogziekten (oftalmologie), straat 111
Raadplegingen dienst oogziekten: 09 224 87 95

Inlichtingen en afspraken: 09 224 71 11

Specialisten

- ▶ Dr. De Kesel R.
- ▶ Dr. De Valck M.
- ▶ Dr. Vereecken M.

Akkoord tot behandeling met een intravitreale injectie

Je oogarts is altijd bereid op al je vragen te antwoorden, zowel op wetenschappelijk als praktisch of financieel vlak.

Gelieve dit document te ondertekenen als bewijs dat de oogarts je correcte en volledige informatie heeft bezorgd.

Ik, ondergetekende (voornaam en naam in hoofdletters)

.....

verklaar dat de aard en de mogelijke risico's van de voorgestelde behandeling mij mondeling werden uiteengezet in door mij verstaanbare bewoordingen en dat mij een bevredigend antwoord werd gegeven op alle gestelde vragen.

Er werd mij voldoende bedenktijd gegeven en ik geef dan ook

mijn toestemming / geen toestemming

tot het uitvoeren van de voorgestelde behandeling met meerdere intravitreale injecties naar gelang de noodzaak.

Datum

Handtekening



**AZ JAN PALFIJN
GENT**

**Meer inlichtingen
Dienst oogziekten
T +32 (0)9 224 87 95**

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be