

CONTACT

Heb je vragen?
Neem dan telefonisch contact met ons op.

NOTITIES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Kinderafdeling
T +32 (0)9 224 83 83

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be



AZ JAN PALFIJN
GENT



24u pH-metrie bij kinderen

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

WAAROM EEN PH-METRIE?

Kinderen en baby's hebben vaak last van reflux. Dit is het terugvloeien van maaginhoud naar de slokdarm. Als er vaker dan gemiddeld zure maaginhoud naar de slokdarm terugvloeit, dan kan deze ontsteken. De oorzaak is een onvoldoende werking van de sluitspier aan de ingang van de maag.

Vaak is reflux zichtbaar wanneer een kind vaak voeding 'terug geeft' of braakt. In het andere geval kan men reflux vermoeden wanneer een kind ongewoon vaak huilt of aanhoudende luchtwegproblemen heeft.

Bij een pH-metrie meet men hoe vaak, hoe lang en wanneer er zure maaginhoud terugvloeit naar de slokdarm. Zo weten we hoe ernstig de terugvloeit is en of deze abnormaal is.

WAT IS EEN 24-UUR PH-METRIE?

Een pH-metrie is een onderzoek waarbij de zuurtegraad of pH in de slokdarm wordt gemeten.

Dit gebeurt door een meettoestel dat is verbonden met een sonde die via de neus tot in de slokdarm gebracht wordt.

Wanneer een baby of kind last heeft van reflux (= het terugvloeien van maagzuur naar de slokdarm) dan zien we tijdens deze 24-uurs-meting veelvuldige episodes van lage pH waarden (< 4).

VERLOOP 24-UURS PH-METRIE

- ▶ Op de dag van het onderzoek mag er nog een fles- of borstvoeding gegeven worden vóór 6 uur 's morgens.
- ▶ Aanmelden om 8 uur bij de inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis.
- ▶ Vervolgens opname op de kinderafdeling (straat 383).
- ▶ Plaatsen van de pH-metrie sonde langs de neus. Onder de neus en op de wang wordt de sonde met een kleefpleister vast gemaakt.
- ▶ De sonde wordt verbonden aan het meettoestel.
- ▶ Controle van de pH-metrie sonde door middel van een RX-thorax (= een röntgenfoto van de borstkas) om te kijken of de sonde op de juiste plaats zit.
- ▶ Na controle van de RX-thorax en eventueel lichte herpositie van de sonde, kan het onderzoek starten. De verpleegkundige geeft uitleg bij het toestel.
- ▶ Vanaf nu mag het kind terug voeding aangeboden krijgen.
- ▶ 24 uur later wordt de sonde terug verwijderd en zal je arts het resultaat komen mededelen en afhankelijk van het onderzoek een behandeling opstarten.
- ▶ Ontslag is voorzien rond de middag.

ENKELE AANDACHTSPUNTEN

- ▶ Let tijdens het onderzoek goed op de handjes van je kind om te voorkomen dat de sonde per ongeluk uitgetrokken wordt. Kousjes over de handjes kunnen dit helpen voorkomen.
- ▶ Meld aan de verpleegkundige wanneer je ziet dat de pleister aan het loskomen is.
- ▶ Indien je kind zuurremmende medicatie neemt, bespreek met je arts of je deze op voorhand dient te stoppen of niet.

WAT BRENG JE MEE?

- ▶ handschoentjes of kousjes
- ▶ fopspeentje en knuffel
- ▶ kledij
- ▶ verzorgingsproducten
- ▶ washandje en handdoek
- ▶ kids-ID
- ▶ bij flesvoeding: eigen zuigfles en poedermelk voor 1 flesvoeding
- ▶ thuismedicatie

PRAKTISCH

Luiers en flesvoeding zijn voorzien.

TEAM

- ▶ Dr Ann-Sofie Alderweireldt
- ▶ Dr Nele Baeck
- ▶ Dr Sophie Vanspeybroeck
- ▶ Dr Rita Vanhecke
- ▶ Dr Erika Matthys
- ▶ Dr Severine Van Hulle
- ▶ Dr Julie Voet
- ▶ Dr Joke Van Vlaenderen

AFSPRAAK
