



AZ JAN PALFIJN
GENT



PROLAPS

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN


Deze brochure geeft je een idee van wat je mag verwachten als je een prolaps behandeling moet ondergaan.

Het is belangrijk dat je zelf achter een ingreep staat. Bij een geplande ingreep heb je tijd om na te denken en te overleggen. Laat je pas opereren wanneer je voldoende weet over alle mogelijkheden om je probleem te onderzoeken of te behandelen. Alle opties kan je ook met de gynaecoloog bespreken.

WAT IS EEN VERZAKKING OF PROLAPS?

10 tot 20% van de vrouwen ontwikkelen ooit klachten van uro-genitale prolaps (= verzakking van de blaas, baarmoeder en/of darm). Ongeveer 19% van alle vrouwen zal hiervoor uiteindelijk een operatie ondergaan.

In het bekken van de vrouw bevindt zich een aantal organen (baarmoeder, vagina, blaas, plasbuis en darm). Deze organen worden ondersteund en op hun plaats gehouden door spieren, pezen (ligamenten) en ander steunweefsel. Samen met het beenderig bekken vormen ze de bekkenbodem. Men spreekt van een verzakking of prolaps als de ondersteuning van deze bekkenorganen onvoldoende is, waardoor één of meerdere van die organen verzakken.



Figuur 1: Doorsnede door vrouwelijk bekken, met normale toestand, resp. verzakking blaas (links), baarmoeder (midden), endeldarm (rechts).

Lichamelijk zwaar werk (heffen), chronische constipatie, overgewicht, uitgesproken vermagering en veelvuldig hoesten (bv. ten gevolge van roken of longaandoening) kunnen de bekkenbodem overbelasten.

Bij sommige vrouwen bestaat er een aangeboren zwakte van steunweefsels en bijgevolg ook een grotere kans op verzakking (Syndroom van Ehlers Danlos, Syndroom van Marfan...).

WAT ZIJN OORZAKEN EN RISICOFACTOREN?

Een verzakking kan ontstaan als

- ▶ er een verzwakking is van de spieren of steunweefsels
- ▶ de ligamenten te sterk uitgerokken zijn
- ▶ het ondersteuningsapparaat afgescheurd is van de bekkenorganen

Zwangerschap en bevalling zijn de grootste risicofactoren. Door een toename van de druk op de bekkenbodem (tijdens zwangerschap en zeker tijdens de bevalling) kan er een verzwakking of beschadiging van de steunweefsels optreden. De verzakking kan al tijdens de zwangerschap of kort erna optreden, maar vaker zal ze pas jaren na de bevalling ontstaan. Met de leeftijd zal de bekkenbodem immers nog verder verzwakken zodat de kans op verzakking verder toeneemt met de jaren.

WAT ZIJN DE KLACHTEN?

Bij de meerderheid van de vrouwen zal met de jaren één of andere vorm van verzakking optreden. Vaak zal deze verzakking geen opvallende klachten geven en dan is er uiteraard geen behandeling nodig.

Bij patiënten die wel symptomen vertonen is een "bolgevoel" of een vaginaal drukgevoel de meest voorkomende klacht (aanwezig bij meer dan 90% van de vrouwen met klachten).

Klachten die minder frequent zijn (toch nog aanwezig bij één op drie met klachten): pijn of hinder tijdens geslachtsgemeenschap, moeilijk leegplassen, urineverlies, stoelgangproblemen en hinder tijdens lichamelijke activiteit.

Minder voorkomende klachten zijn: pijn ter hoogte van het bekken of de onderrug, frequent plassen of een gevoel van sterke aandrang om te plassen.

WELKE TYPES VAN PROLAPS ZIJN ER?

- ▶ verzakking van de voorwand van de vagina
= verzakking van de blaas en/of urinebuis
- ▶ verzakking van de achterwand van de vagina
= verzakking van de endeldarm (rectum) en/of dunne darm
- ▶ verzakking van de baarmoeder of van de vaginakoepel
= meestal een verzakking van de dunne darm

orgaan	benoeming van de verzakking
blaas	cystocele
endeldarm (rectum)	rectocele
dunne darm	enterocele
vaginakoepel	koepelprolaps of topprolaps
baarmoeder	descensus uteri of uterusprolaps
wanneer alles verzakt is	procidentia

WELKE ONDERZOEKEN ZIJN NODIG?

Meestal kan je arts louter op basis van jouw klachten en het lichamelijk onderzoek zich een goed beeld vormen over het type van verzakking.

Bij onzekerheid over het type verzakking (bv. wanneer het niet duidelijk is welke organen er achter de uitstulping schuil gaan) of over de juiste aanpak kan aanvullend onderzoek nodig zijn.

Zo kan bijvoorbeeld een urodynamisch onderzoek gebeuren, om te zien hoe de blaas werkt. Bij dit onderzoek brengt de arts via de urineleider een dun slangetje (katheter) in de blaas en vult deze met vocht. Terwijl je hoest of plast krijgt de arts informatie over de blaasspier, de werking van de bekkenbodemp en het soort urineverlies.

Een defecogram is een onderzoek dat gedaan wordt bij ontlastingsproblemen. Via de anus wordt een contrastmiddel in het laatste deel van de dikke darm (rectum) gebracht. Soms wordt ook een contrastmiddel in de vagina gebracht en krijg je

contrastvloeistof te drinken om de dunne darm zichtbaar te maken. Terwijl je op een toilet ontlasting hebt, worden röntgenfoto's of een video-opname gemaakt. Zo ziet de arts hoe de dikke darm werkt en of deze verzakt is.

Meer en meer wordt voor de beeldvorming ook echografie gebruikt.

WAARUIT BESTAAT DE BEHANDELING?

Een verzakking die geen ernstige klachten veroorzaakt moet in principe geen behandeling krijgen. Wanneer er echter hinder ontstaat kan de patiënte om een behandeling vragen. Het is belangrijk te weten dat dergelijke behandeling meestal niet dringend is.

Slechts in zeer zeldzame gevallen kan door de verzakking de blaas-, darm- en/of de nierfunctie in het gedrang komen. Enkel dan mag de behandeling niet uitgesteld worden.


Afhankelijk van de ernst van de klachten en de bevindingen van de arts, kan de behandeling bestaan uit kinesithérapie, een vaginale ring (pessarium) of een heelkundige ingreep.

Kinesithérapie

Deze behandeling is het meest doeltreffend bij patiënten met urineverlies tijdens inspanningen (stressincontinentie). Bij verzakking is deze behandeling minder doeltreffend. Toch kan een versterking van de bekkenbodemspieren bij een matige verzakking de klachten enigszins doen verminderen.

Een pessarium of vaginale ring

Een pessarium is een ring uit kunststof waarvan de grootte en vorm kunnen variëren en die in de vagina wordt geplaatst om de organen die verzakt zijn terug op hun plaats te duwen. Een goed passende ring voel je niet zitten en hoeft niet noodzakelijk geslachtsgemeenschap te belemmeren.



Figuur: doorsnede door vrouwelijk bekken met een pessarium ter plaatse.

Patiënten met een pessarium worden op regelmatige tijdstippen (6-12 maanden) gezien door een arts om eventuele klachten (bloedverlies, afscheiding) ten gevolge van het pessarium op te lossen.

Verzakkingen van de voorwand van de vagina zijn meestal makkelijker te behandelen met een ring dan een verzakking van de achterwand.

Patiënten die al geopereerd werden voor een verzakking, of patiënten met een wijde opening van de vagina, zijn vaak moeilijker te behandelen met een vaginale ring omdat deze dan kan uitgestoten worden.

Operatie

In sommige gevallen van verzakking zal een operatie de beste oplossing zijn. Het soort en de ernst van de verzakking en de ernst van de klachten zullen mee de operatietechniek bepalen. Welke de beste operatietechniek is, wordt door de arts met jou besproken.

De operaties kunnen ingedeeld worden in buikoperaties en vaginale operaties.

Er zijn twee types buikoperaties: sommige kunnen via een laparoscopie (kijkoperatie) uitgevoerd worden, andere via laparotomie (open buikoperatie).

Soms zal het verzwakte of beschadigde weefsel hersteld worden door middel van hechtingen. Bij andere operaties kan het gebruik van een netje (mesh) noodzakelijk zijn om de verzakking op te heffen.

De arts kan ook beslissen om verschillende operaties terzelfdertijd uit te voeren. Bespreek met je arts welke zijn/haar persoonlijke ervaring is met de voorgestelde procedure.

Hieronder vind je een overzicht van de meest gebruikelijke operaties. Misschien kan de arts in jouw situatie nog een ander type operatie aanraden. Dit zal dan uitvoerig besproken worden op de raadpleging.

IN GEVAL VAN OPERATIE: DE OPERATIETECHNIKEN

1. Voorwandplastiek (“blaasopnaaiing”)

Deze operatie wordt uitgevoerd als de voorwand van de vagina verzakt is (blaas met of zonder urinebuis). Deze ingreep verloopt via de vagina. Er wordt een insnede gemaakt in de voorwand van de vagina om het verzwakte steunweefsel onder de blaas terug te versterken en te hechten. Indien nodig kan het overtollige weefsel van de vagina worden verwijderd. Nadien wordt de vaginawand terug gesloten. Soms kan hierbij nog een netje (mesh) gebruikt worden ter versterking van het steunweefsel.


2. Achterwandplastiek (“darmopnaaiing”)

Deze operatie wordt uitgevoerd om de achterwand van de vagina weer op zijn plaats te brengen. Er wordt een insnede gemaakt in de vagina-achterwand. Het verzwakte steunweefsel van de darm wordt op de middellijn weer bij elkaar gebracht en gehecht. Ook hier kan het overtollige vaginaweefsel worden verwijderd alvorens de vagina weer wordt gesloten. Voor deze operatie wordt soms ook een netje gebruikt.

3. Schedetop

- **Sacrocolpopexie:**

Bij een verzakking van de vaginakoepel wordt deze via een kijkoperatie of via een open buikoperatie aan het heiligbeen (sacrum) gehecht. Hiervoor wordt een mesh gebruikt.



Figuur sacropexie. Links situatie voor de operatie, rechts erna.

- **Sacrospineuze fixatie:**

Hierbij wordt langs de vagina een insnede gemaakt op de achterwand van de vagina. Het sacrospineus ligament (een “pees” ter hoogte van het beenderig bekken) wordt opgezocht en de vaginakoepel wordt hieraan vastgehecht. Soms wordt deze ingreep gecombineerd met het verwijderen van de baarmoeder, waarna de chirurg de overblijvende vaginatop aan dit ligament vasthecht. Hiervoor wordt soms ook een netje of mesh gebruikt.

4. Hysterectomie (verwijderen van de baarmoeder)

In sommige gevallen moet de baarmoeder verwijderd worden. Deze operatie kan vaginaal gebeuren of via een kijkoperatie of open buikoperatie.

De arts kan ook beslissen om enkel het baarmoederlichaam te verwijderen en de baarmoederhals aanwezig te laten. Deze operatie kan enkel via een kijkoperatie of via een open buikoperatie.

Verdoving

- ▶ Bij operaties die via de vagina gebeuren is zowel een ruggenprik (rachi of spinale anesthesie) als een algemene verdoving (narcose) mogelijk.
- ▶ De buikoperaties (laparoscopie of ipv laparotomie) gebeuren altijd onder een algemene verdoving.

Samen met de anesthesist kan je bespreken voor welke verdoving je in aanmerking komt.

Belangrijke opmerkingen in verband met de ingreep:

- ▶ Voor de ingreep moet je minstens 8 uur nuchter zijn. Dit betekent dat je niet meer mag eten, drinken of roken. Indien deze maatregel niet gerespecteerd wordt, kan de operatie niet doorgaan.
- ▶ Vermeld altijd duidelijk aan welke ziekten je eventueel lijdt (bv. suikerziekte, reuma, hoge bloeddruk) en welke medicatie je hiervoor neemt (bv. insuline, steroïden, bloedverdunners, aspirine).
- ▶ Bepaalde medicatie (bv. bloedverdunners) moeten voor de operatie gestopt of aangepast worden. Dit gebeurt altijd in overleg met je arts. Eventueel dient er tijdelijk een andere medicatie opgestart te worden.
- ▶ Indien je allergisch bent aan bepaalde medicatie (bv. antibiotica, pijnstillers), ontsmettingsmiddelen, latex (rubber) en/of pleisters moet je dit zowel aan de gynaecoloog, de anesthesist als de verpleging melden.

OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

- ▶ De duur van je ziekenhuisverblijf hangt onder andere af van het soort operatie en eventuele ziektes waarvoor je al behandeld wordt, maar varieert ook van persoon tot persoon. Over het algemeen schommelt dit tussen enkele dagen tot ongeveer een week.
- ▶ De eerste dagen na de operatie wordt er voor voldoende pijnstilling gezorgd.
- ▶ Na de operatie heb je meestal een blaaskatheter. Deze mag na één of meerdere dagen verwijderd worden. Na het verwijderen zal de verpleegkundige controleren of je voldoende kan plassen en helemaal leeg plast. Als dat na enige tijd niet lukt, krijg je eventueel opnieuw een katheter of leer je de blaas zelf katheteriseren.
- ▶ Er kan door de arts bij een verzakkingsoperatie ook een vaginale tampon ingebracht worden om kleine bloedingen te stelpen of het herstel tijdens de eerste uren te ondersteunen. De tampon wordt 1 tot 2 dagen na de operatie verwijderd.
- ▶ Soms wordt tijdens de operatie een drain geplaatst. Dit is een dun rubberen buisje dat via de buikwand naar buiten komt. De drain voert overtollig wondvocht en bloed af. Deze wordt verwijderd als er praktisch geen vocht meer naar buiten komt.
- ▶ De eerste stoelgang kan lastig zijn en vaak worden laxeermiddelen gebruikt. Vaak wordt uit voorzorg een licht laxeermiddel voorgeschreven bij ontslag.

HERSTEL THUIS

Het herstel is afhankelijk van verschillende factoren: onder andere je leeftijd, de algemene gezondheid, en het type operatie spelen hierin een rol.

Er kunnen zich een aantal klachten voordoen na de ingreep. Meestal kan je de eerste weken na de operatie wat bloedverlies of gelig verlies hebben. Je kan een moeilijke stoelgang ervaren of wat last hebben bij het plassen, en je kan je nog wat vermoeid voelen.

Afhankelijk van het type operatie zal je ongeveer 3 tot 6 weken na de ingreep op controle bij de dokter gaan. Indien alles normaal bevonden wordt, mag je jouw activiteiten geleidelijk terug hernemen.

Je neemt best de volgende adviezen ter harte:

- ▶ Vermijd teveel persen bij ontlasting.
- ▶ Drink voldoende en blijf in beweging om de stoelgang te bevorderen.
- ▶ Vermijd heffen van lasten van meer dan 5 kg tot 6 weken na de operatie. Soms wordt nog een langer hefverbod voorgesteld.
- ▶ Wacht met geslachtsgemeenschap tot na je controle-onderzoek.
- ▶ Sportieve activiteiten moeten uitgesteld worden tot na de controle bij je arts. Het spreekt voor zich dat bij heropstarten ervan de inspanningen gedoseerd opgedreven moeten worden. Bespreek deze sportactiviteiten met je arts.
- ▶ De meeste artsen schrijven werkonbekwaamheid voor tot wanneer je op controle bent geweest (gemiddeld 3 tot 6 weken).

WAT ZIJN DE NEVENWERKINGEN EN RISICO'S?

WAT IS DE KANS OP HERVAL?

Niet elke ingreep verloopt altijd even gemakkelijk. Ook het genezingsproces verloopt niet altijd even vlot. Sommige problemen zijn jammer genoeg onvoorspelbaar.

Onder nevenwerkingen verstaan we het optreden van niet gewenste verschijnselen, die het gevolg kunnen zijn van de ingreep, zelfs indien deze probleemloos verlopen is. Soms treden er tijdens of na de ingreep verwickelingen (complicaties) op waarvoor bijkomende medische zorg (medicatie en/of heelkundige ingreep) nodig is.

Op termijn kan er opnieuw verzakking optreden. Indien deze zich op dezelfde plaats voordoet spreekt men van een "recidief". Uiteraard kan er ook nog een verzakking optreden op een andere plaats in de vagina.

Hieronder beschrijven we de meest frequente nevenwerkingen en verwickelingen.

Blaasontsteking (cystitis)

Dit is de meest voorkomende complicatie. Deze kan zich o.a. uiten door pijn en frequent plassen. Bij een bewezen blaasinfectie zal de arts medicatie voorschrijven.

Problemen bij het op gang komen van zelfstandig plassen.

Vaak kunnen vrouwen na het herstel van de voorwand van de vagina moeilijkheden ondervinden om spontaan te plassen of om de blaas volledig te ledigen. Dit is een tijdelijk probleem. Dit kan opgevangen worden door tijdelijk een nieuwe katheter te plaatsen of tijdelijk zelf te katheteriseren.

Incontinentie

Sommige vrouwen hebben urineverlies na de operatie. Dit kan verschillende oorzaken hebben en zal verder onderzoek noodzakelijk maken. Soms is hiervoor later nog een operatie nodig.

Moeite met de ontlasting

Deze klacht zal voornamelijk ontstaan na een achterwandplastiek. Preventieve dieetmaatregelen (inname van vezels), voldoende drinken, voldoende lichaamsbeweging en eventueel opstarten van een laxeermiddel kunnen hierbij helpen. Normaal gezien zijn deze klachten tijdelijk.

Niet zelden echter bestonden deze klachten ook al voor de ingreep en zal een ingreep ter correctie van de verzakking wellicht geen beterschap van de constipatie opleveren.

Last of pijn bij geslachtsgemeenschap

Door de veranderingen die opgetreden zijn ter hoogte van de vagina kan er soms pijn optreden tijdens het vrijen. Meestal is dit tijdelijk en verdwijnt dit wanneer het litteken versoepelt. Voorzichtigheid in het begin en het gebruik van een glijmiddel kan hierbij helpen. Bij het gebruik van netjes komt deze klacht misschien wat vaker voor.

Meshcomplicaties

Wanneer lichaamsvreemd materiaal gebruikt wordt zoals een mesh (netje) kunnen er specifieke problemen optreden: bloed- of vuilverlies, irritatie of pijn, problemen bij geslachtsgemeenschap.

Zo kan een gedeelte van het netje vaginaal zichtbaar worden (expositie of erosie). Soms is een behandeling met een hormoon (oestrogeen)-crème en een antibioticum voldoende. Soms moet er evenwel een tweede ingreep uitgevoerd worden om de mesh met vaginaal weefsel te bedekken en/of een deel van het blootgestelde netje te verwijderen. Meshcomplicaties kunnen al kort na de operatie optreden. Daar de meeste van deze netjes permanent in het lichaam aanwezig blijven, kunnen complicaties echter evengoed op langere termijn ontstaan. Het is nuttig dat je aan je arts vraagt welk specifiek netje hij/zij gebruikt heeft.

Vaginale afscheiding

Bloedverlies, afscheiding en irritatie gedurende enkele weken na de operatie kunnen normaal zijn. Raadpleeg je arts bij blijvende last. Andere vaginale klachten worden best verder onderzocht.

Zeldzame problemen:

Nabloeding

Wanneer er een hevige bloeding optreedt, moet je onmiddellijk je arts raadplegen!

Letsels van omliggende organen

Bij een verzakkingsoperatie wordt in de nabijheid van andere organen gewerkt. Hierdoor kunnen er letsels ontstaan aan deze organen. Indien deze tijdig herkend worden, kunnen ze dadelijk hersteld worden.

Indien deze letsels niet onmiddellijk herkend worden kan een tweede ingreep nodig zijn. Dit is vooral het geval bij het ontstaan van een fistel (= abnormale verbinding tussen blaas of darm met vagina of huid).

Zeer zelden kan de verbinding tussen de nier en de blaas ureter afgesloten worden of ontstaan er zenuwletsels.

Flebitis of embolie (= bloedklonters)

Dit kan optreden na alle ingrepen die een tijdelijke vermindering van de lichaamsactiviteiten met zich meebrengen. Daarom worden vaak steunkousen voorgeschreven ter bevordering van de bloeddorstrooming. Bovendien wordt meestal tijdelijk een bloedverdunner opgestart.

Vraag in elk geval onmiddellijk raad bij je arts (huisarts of gynaecoloog) bij:

- ▶ toenemende pijn na de operatie ondanks inname van pijnstillers
- ▶ aanhoudende misselijkheid en braken
- ▶ hevig vaginaal bloedverlies (meer dan tijdens de menstruatie)
- ▶ koorts (meer dan 38 °C)
- ▶ blaasontsteking (branderig gevoel of pijn bij plassen)

Resultaat op lange termijn

Bij een prolapsoperatie wordt het onderliggende probleem (zwak of beschadigd weefsel) niet ten gronde opgelost. Men schat dat één op drie vrouwen op termijn opnieuw problemen zal krijgen van een verzakking. Er kan opnieuw een verzakking op dezelfde plaats ontstaan, maar meer frequent gebeurt dit op een andere plaats in de vagina.

ZWANGERSCHAP NA EEN PROLAPSOPERATIE

Wanneer je nog een kinderwens hebt, moet je dit aan je arts melden. Zo kan de arts rekening houden met de operatietechniek en eventueel de wijze van bevalling.

Deze brochure beschrijft een niveau van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde omstandigheden. Een gynaecoloog kan hiervan afgewijken wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer een gynaecoloog moet tegemoet komen aan de objectieve noden en/of subjectieve behoeften van een individuele patiënte.

stempel en contactgegevens behandelende arts:



Copyright en brontekst: Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie



**AZ JAN PALFIJN
GENT**

Dienst Gynaecologie

Inlichtingen en afspraken: T +32 (0)9 224 71 11

Watersportlaan 5 - 9000 Gent

T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42

info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be