




AZ JAN PALFIJN
GENT



AZ JAN PALFIJN
GENT

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

versie folder: omei - v.u.: Rudy Coddens, voorzitter



Radiotherapie

als deel van de kankerbehandeling

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

PRAKTISCH

Uw arts stelde u als kankerbehandeling bestraling voor, dit is externe (uitwendige) radiotherapie. Deze behandeling kan indien nodig worden gecombineerd met met andere behandelingen zoals een heelkundige ingreep of chemotherapie.

Het eerste contact met de radiotherapeut vindt plaats in het AZ Jan Palfijn Gent. We kiezen er bewust voor om u in een vertrouwde omgeving te laten kennismaken zodat de drempel zo laag mogelijk wordt. De arts legt u in dit eerste gesprek uit waarom de bestraling nodig is en op welke manier de behandeling verloopt.

De behandeling zelf vindt plaats in een ander Gents ziekenhuis.

Voor de aanvang van de bestraling voorzien we een aantal voorbereidende sessies, waarin een planning en simulatie worden opgemaakt. Dit houdt in dat de behandeling technisch wordt uitgetekend en gecontroleerd op accuraatheid en veiligheid. Het aantal bestralings-sessies is afhankelijk van de indicatie en varieert van één tot dertig sessies. Deze sessies worden elke werkdag op hetzelfde tijdstip gegeven, de intensiteit kan wel variëren. Na een bestraling kan u naar huis gaan, u hoeft dus niet te worden opgenomen.

INDICATIES

Nabehandeling van geopereerde kanker

- ▶ Bij krappe snijranden, onvolledige wegname van het gezwel.
- ▶ Borstsparende heelkunde.
- ▶ Bij prostaatkanker met hoge kans op lokaal herval.
- ▶ Gezwel van het hoofd-halsgebied.

Alternatief voor heelkunde

- ▶ Primaire radiotherapie bij een beginstadium. Dit

resulteert in even goede resultaten als een heelkundige ingreep maar met andere bijwerkingen.

- ▶ Primaire radiotherapie met curatief (genezend) doel bij een patiënt die om medische redenen niet kan geopereerd worden.

Combinatie met chemotherapie

- ▶ Concomitant = gelijktijdig met chemotherapie
- ▶ Sequentieel = na chemotherapie

Pijnstilling of gevaar voor complicaties

- ▶ Uitzaaing in het bot, in de borstkaswand, in een voelbare klier of een onderhuids letsel, in de hersenen.
- ▶ Verdrrukking van de grote luchtwegen, gevaar voor ophoesten van bloed.
- ▶ Op een insteekplaats van een drain.
- ▶ Bloeding uit het gezwel.

BIJWERKINGEN

Bijwerkingen ontstaan doorgaans pas enkele dagen tot weken na aanvang van de behandeling. Meld dit steeds op de dienst Radiotherapie en bespreek dit met de behandelende arts.

Welke bijwerkingen zijn mogelijk?

- ▶ Ontsteking van de slijmvliezen van mond, keel en slokdarm: sliklast, pijn.
behandeling: Syngel, aangepaste dranken en voedsel, frequent bevochtigen.
- ▶ Huidproblemen: roodheid, jeuk, pijn, vochtige huid.
behandeling: Calendula crème, Flamigel, Flamigel Hydro, advies wondzorgspecialist.
- ▶ Longen: pneumonitis met droge hoest, kortademigheid, vermoeidheid.
behandeling: controle met longfoto, cortisone innemen.

- ▶ Bloedceldaling door effect op het beenmerg dat bloedcellen aanmaakt.
 - ▶ Bloedarmoede met vermoeidheid, ijlhoofdigheid, kortademigheid, snelle hartslag.
 - ▶ Tekort aan witte bloedcellen met verhoogde kans op infecties.
 - ▶ Tekort aan bloedplaatjes met ontstaan van blauwe plekken, bloedend tandvlees.

Ondersteunende maatregelen: bloedtransfusie, infectiepreventie door antibiotica, groeifactoren.

ONVERWACHT PROBLEMEN

Bij het onverwacht optreden van neveneffecten of problemen, kan u steeds contact opnemen met uw behandelende radiotherapeut.

Indien deze arts niet bereikbaar is, kan u bellen naar:
08:00 - 17:00 uur: 09 224 81 11 (Call center)
17:00 - 08:00 uur: 09 224 81 01 (Spoedgevallen)