

AKKOORDVERKLARING VOOR DE INGREEP STERILISATIE

Na uitvoerig en op een verstaanbare manier over de aard van de ingreep, de gevolgen en de mogelijke risico's ervan, te zijn ingelicht door

en na zelf ook alle voor- en nadelen van de ingreep te hebben overwogen, heb ik er toch vrijwillig en in eigen verantwoordelijkheid toe beslist om bij mij een heekkundige sterilisatie te laten doorvoeren.

Ik ben mij er terdege van bewust dat **deze ingreep definitief is** en ik weet ook dat, zelfs als ik later mijn huidige weloverwogen beslissing zou wijzigen, een latere ingreep voor het weer ongedaan maken van de sterilisatie slechts een geringe kans op succes biedt.

Alle onvoorzienbare veranderingen van mijn huidige persoonlijke toestand (zoals mogelijke sterfgevallen, echtscheiding, nieuwe relatie, enz.) heb ik mede in overleg genomen om tot mijn huidige beslissing te komen, en deze veranderen ook niets aan mijn niet herroepbare huidige beslissing.

Ik, ondergetekende
geef hierbij dan ook aan
mijn akkoord om bij mij een heekkundige sterilisatie uit te voeren.

Datum :

Handtekening :

6. WASSEN

Douchen kan reeds na een paar dagen. Gebruik van ze-
pen, badschuim of douchegel zijn weliswaar af te raden
gedurende één week. Baden is mogelijk na één week.
Baden in een zwembad of de zee wordt best vermeden
gedurende 14 dagen om infectie te vermijden.

7. POSTOPERATIEVE CONTROLES

Een wondcontrole is te voorzien na één week. Ten vroeg-
ste na 2 maanden dient er een eerste spermastaaltje
onderzocht te worden. Indien er hierin reeds geen sper-
matozoïden meer aanwezig zijn, moet dit bevestigd
worden door een tweede onderzoek een maand later.
Pas als er twee staaltjes zijn met 0 zaadcellen, kan de
sterilisatie als veilig worden beschouwd. Het verdwijnen
van zaadcellen uit het sperma kan soms meer tijd vra-
gen (eventueel zelfs 6 maanden) zonder dat er sprake
is van een abnormaliteit of een mislukking.



AZ JAN PALFIJN
GENT

Meer inlichtingen
T +32 (0)9 224 88 03

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be



AZ JAN PALFIJN
GENT

Sterilisatie

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

1. UITLEG BETREFFENDE

STERILISATIE

Bij de heelkundige ingreep (ambulant en onder plaatselijke verdoving) worden kleine stukjes van de rechter- en de linkerzaadleider verwijderd. De ontstane uiteinden worden toegebrand en dichtgebonden, waardoor het transport van zaadcellen voor altijd onderbroken blijft. Door deze ingreep wordt de man gedurende zijn verdere leven onvruchtbaar en kan hij dus geen kinderen meer verwekken.

Het resultaat van de ingreep treedt pas in wanneer, bij onderzoek van het zaadvocht, geen zaadcellen meer gezien worden. Voor deze vaststelling moeten er minstens 2 onderzoeken van het zaadvocht worden gedaan. Dit kan ten vroegste 2 maanden na de ingreep omdat de zaadleiters en zaadblaasjes nog geledigd moeten worden van de resterende zaadcellen.

Gedurende die tijd moet er dus een ander voorbehoedsmiddel worden gebruikt tot het zaadonderzoek tweemaal geen zaadcellen meer aantoon.

2. MOGELIJKE COMPLICATIES

NA DE INGREEP

Meestal treden er geen complicaties op, maar toch kunnen er wondinfecties (0 - 6%) en bloeduitstortingen (0 - 18%) optreden ter hoogte van de wondjes aan het balzakje.

Tevens kunnen er kleine bindweefselknobbeltjes (zogenoemde zaadstrenggranulomen) ter hoogte van de sneevlakken van de zaadleider ontstaan (4 -10%).

In uitzonderlijke gevallen kan er, door opnieuw samengroeien van de doorgesneden uiteinden van de zaadstreng, opnieuw een doorgankelijkheid van de zaadleider(s) ontstaan waardoor er opnieuw vruchtbaarheid

kan ontstaan (0,2%).

Het optreden van een lichte bloeding of zwelling en een grote blauwe plek is volledig normaal. Heel uitzonderlijk kan er een infectie optreden. In dat geval zal er een flinke zwelling ontstaan die kan gepaard gaan met roodheid, pijn en eventueel hoge koorts.

3. GENEZINGSPROCES

Meestal genezen de 2 wondjes heel vlot. De gebruikte draadjes verteren vanzelf. Deze vertering kan gepaard gaan met wat vochtscheiding welke niet onmiddellijk op ontsteking wijst. Een beetje zwelling van het scrotum en wat bloeding tussen de draadjes gedurende de eerste twee of drie dagen is normaal. Een grote blauwe plek ter hoogte van het scrotum is eveneens normaal en verdwijnt na een 10-tal dagen.

4. POSTOPERATIEVE VERZORGING

Het is heel belangrijk veel te rusten (liggend) tijdens de eerste uren na de sterilisatie. Hierdoor zal er zo weinig mogelijk zwelling optreden en dus zo weinig mogelijk pijn. De wondjes worden best tweemaal daags ontsmet met Isobetadine, bijvoorbeeld gedurende één week.

5. KLEDIJ

Spannend ondergoed is aan te raden enerzijds om de verbandjes op hun plaats te houden en anderzijds om zwelling te vermijden.