



AZ JAN PALFIJN  
GENT



AZ JAN PALFIJN  
GENT

Kinderafdeling: +32 (0)9 224 83 83  
Urologie, raadplegingen: +32 (0)9 224 88 03  
Spoedopname: +32 (0)9 224 81 01

Watersportlaan 5 - 9000 Gent  
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42  
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

versie folder november 2014 - v.u.: Rudy Coddens, voorzitter

# Verzorging na besnijdenis

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

## WAT IS EEN BESNIJDENIS?

Een besnijdenis is een gedeeltelijke verwijdering van de voorhuid waardoor de glans geheel of gedeeltelijk ontbloot blijft.

## GENEZINGSPROCES

De eikel is zeer gevoelig gedurende één week en meer dan gevoelig gedurende nog eens twee weken. De genezing verloopt min of meer zoals bij een brandwonde. Er is een oppervlakkige schaafwonde die wat vocht afgeeft.

Dit vocht droogt op tot een dikke korst en onder deze korst vormt zich nieuw slijmvlies. De korst valt af na een 10-tal dagen. De gebruikte draadjes versterven vanzelf.

Bij een eerste plasje kan je kind pijn en/of angst ervaren. Zorg ervoor dat je kind voldoende drinkt.

## VERZORGING

### 3.1 Verzorging van de wonde

De wonde geneest het snelst als er geen zalf en geen verband worden aangebracht. Bovendien doet de wonde geen pijn als je er niet aankomt.

Onmiddellijk na de ingreep wordt wel een klein verbandje aangebracht. Vaak valt dit spontaan af in de eerste uren. Indien het verband na 24 uur niet spontaan afgevallen is, dient het verwijderd te worden.

Om pijn en vastkleven aan de wonde te vermijden, is het aan te raden het verbandje eerst door en door nat te maken met steriel water (of mineraal water uit een merkfles).

### 3.2 Wat bij pijn? (pijnprotocol kinderen)

- ▶ Na een narcose is het belangrijk uw kind 24u te observeren.
- ▶ Wacht niet tot het moment dat de pijn echt doorbreekt, maar probeer al bij de eerste tekenen pijnmedicatie te geven.
- ▶ Geef niet meer dan de voorgestelde dosis.
- ▶ Probeer de laatste dosis van de pijnstiller zo kort mogelijk voor 't slapengaan te geven zodat uw kind 's nachts pijnvrij is.
- ▶ De dag nadien en de volgende dagen kunt u verder paracetamol en/of ibuprofen siroop te geven. Houd u daarbij aan de voorgeschreven hoeveelheid!
- ▶ *Paracetamol: 15mg/kg max. om de 6u: ..... ml  
Laatste dosis om ..... u gegeven*
- ▶ *Ibuprofen : 10mg/kg max om de 6 uur: .....ml  
Laatste dosis om ..... u gegeven*

## KLEDIJ

Vaak wordt het contact van een broek tegen de eikel niet verdragen in de eerste week. Het is aan te raden het kind de eerste week in huis te laten rondlopen met een lange T-shirt.

Buitenspelen is overigens af te raden, gezien er geen contact mag zijn tussen het wondje enerzijds en aarde, zand of water bij het zwemmen anderzijds en dit gedurende minstens 14 dagen.

## WASSEN

Douchen met lauw water kan na een paar dagen. Na de douche dient de penis goed afgedroogd te worden, eventueel met een haardroger.

Baden in lauw water kan vanaf één week ongeveer. Gebruik van zepen, badschuim en douchegel worden het best vermeden de eerste twee weken.

Baden in zee of in een zwembad zijn af te raden gedurende de eerste 3 weken wegens infectiegevaar.

## COMPLICATIES

Een complicatie die kan optreden is bloeding. Meestal is dergelijke bloeding zeer beperkt en gemakkelijk te stoppen door 5 minuutjes hard op de penis te duwen.

Slechts indien dit onvoldoende is, dient eventueel een spannend verband aan de penis aangebracht te worden door een arts.

Een klein beetje bloeding gedurende de eerste twee à drie dagen is overigens volledig normaal.

Een tweede, zeldzame complicatie is ontsteking. Tekens hiervan zijn toenemende pijn, zwelling en koorts.

Neem contact op met de dienst Urologie of de Kinderafdeling indien er:

- ▶ meer dan 38°C koorts optreedt.
- ▶ toenemende pijn en zwelling van de penis ontstaat.
- ▶ etter uit de wonde komt.