

CONTACTGEGEVENS IVF-CENTRUM

Telefonisch:

weekdagen

8u - 16u: 09/224 88 50

weekends (enkel voor dringende vragen)

8u - 12u: 09/224 88 50

Op **andere uren** kan u bellen naar de Spoedafdeling:

09/224 81 01

Via e-mail:

ivf.centrum@janpalfijngent.be



AZ JAN PALFIJN
GENT

Fertiliteitscentrum

T +32 (0)9 224 88 50

Watersportlaan 5 - 9000 Gent

T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42

info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be



AZ JAN PALFIJN
GENT

versie folder maart 2016 - vu... Rudy Coddens, voorzitter

Richtlijnen bij TESE

(*Testiculaire sperma extractie*)

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

RICHTLIJNEN BIJ OPNAME VOOR TESE

(Testiculaire sperma extractie)

1. Doel van de ingreep
2. Wat krijgt u mee na ontslag op de verpleegeenheid?
3. Welke pijnstillende medicatie kan u nemen na ontslag?
4. Verzorging van de wonde
5. Aandachtspunten voor de patiënt na de operatie
6. Extra kosten voor het invriezen van zaadcellen

1. Doel van de ingreep

Operatief bekomen van zaadcellen uit een biopsie, genomen uit de teelbal.

2. Wat krijgt u mee na uw ontslag op de verpleegeenheid?

- een briefje voor arbeidsongeschiktheid
- een voorschrift voor:
 - Iso-betadine Dermique®
 - Diclofenac® 75 mg
 - Dafalgan® 1 g
 - Steriele gaas-kompressen 7,5 cm x 7,5 cm

3. Welke pijnstillende medicatie kan u nemen?

Indien u geen maagklachten heeft, mag u Diclofenac® innemen:

- maximum 2 per dag, gedurende de eerste 2 à 3 dagen.
- u mag reeds een eerste Diclofenac® innemen op de avond van de operatiedag.

Diclofenac® werkt pijnstillend en ontstekingswerend en helpt eveneens tegen de zwelling.

U kan ook kiezen voor pijnstilling met Dafalgan® 1 g, neem er hiervan maximum 4 per dag.

4. Verzorging van de wonde

U mag vanaf de dag na de ingreep de suspensoir (het draagverband) even afnemen om een douche te nemen. Hou het wondverband aan tijdens de douche. Verwijder na de douche het wondverband, dep de wonde goed droog en ontsmet ze met Isobetadine®. Breng de suspensoir opnieuw aan waarbij een steriel kompres tussen de wonde en het suspensoir wordt geplaatst.

OPGELET

- Kleef het kompres niet meer vast!
- Herhaal deze behandeling dagelijks gedurende één week.

5. Aandachtspunten

U dient zich rustig te houden om nabloedingen te voorkomen.

De wonde mag niet week worden. Daarom adviseren we u om:

- de wonde goed droog te deppen na het wassen.
- een week niet te zwemmen.
- geen ligbaden te nemen tot het naadje goed genezen is.
- geen geslachtsgemeenschap te hebben tot het naadje goed genezen is.

De draadjes moeten niet verwijderd worden. Voor de hechting wordt snel verteerbare draad gebruikt.

OPGELET

Een zekere zwelling van de balzak is normaal.

Bij een zienderogen toenemende zwelling van de balzak en pijn, moet u meteen contact opnemen met de behandelende arts. De contactgegevens vindt u op de achterflap van deze folder.

6. Extra kosten voor invriezen

Hou er rekening mee dat het invriezen van zaadcellen extra kosten met zich meebrengt.

Voor het bewaren van ingevroren sperma wordt een jaarlijkse kost gefactureerd.

Meer informatie over de tarieven kan u vragen aan de medewerkers van het fertiliteitscentrum.