

Ernstige complicaties:

- ▶ Een infectie binnen het oog: 0,16%
- ▶ Netvliesloslating: 0,15%
- ▶ Lensschade: 0,07%

Bij ernstige bijwerkingen zijn bijkomende behandelingen en eventueel een ingreep nodig.

Minder ernstige complicaties:

- ▶ Een bloeding
- ▶ Oogdrukstijging
- ▶ Reactie op de medicatie

8. KOSTPRIJS VAN EEN INTRAVITREALE BEHANDELING

De indicaties voor een terugbetaalde behandeling zijn de laatste jaren verder uitgebreid waardoor de kost meestal beperkt is.

Indien je aandoening niet onder een terugbetaling valt, zal de oogarts je hierover inlichten.

Af en toe dient voor de diagnose of opvolging een OCT scan (Optical Coherence Tomography) te gebeuren. Deze scan wordt momenteel niet terugbetaald door het ziekenfonds. Het ziekenhuis rekent hiervoor 40 euro aan.

Een behandeling met intravitreale injectie bestaat uit meerdere injecties naargelang de aard van de aandoening, doorgaans met een pauze van een paar weken tussen de injecties.

9. SPECIALISTEN (POLIKLINIEK) OOGZIEKTEN

- ▶ Dr. Boeckeaert Jolien
- ▶ Dr. De Kesel Roxane
- ▶ Dr. De Valck Mia



**AZ JAN PALFIJN
GENT**

**Raadplegingen Dienst Oogziekten, straat 111
09 224 87 95**

**Afspraken Dienst Oogziekten
09 244 81 11**

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be



**AZ JAN PALFIJN
GENT**

**BEHANDELING
MET VAATGROEIREMMER
(ANTI - VEGF):
een intravitreale injectie**

1. WAT IS EEN INTRAVITREALE

INJECTIE?

Een intravitreale injectie is een inspuiting van een kleine hoeveelheid vloeibare medicatie in het glasvocht van het oog.

De vaatgroeiremmer remt de groei van de nieuwgevormde, lekkende bloedvaten die ontstaan ten gevolge van de oogziekte. Door de injecties trekt het oedeem (het vocht) weg en kan de visus (het zicht) mogelijk opnieuw verbeteren.

Deze procedure wordt meermaals uitgevoerd bij een behandeling.

2. WORDT DIT TERUGBETAALD?

Intravitreale injecties met vaatgroeiremmers worden terugbetaald bij:

- ▶ Natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie
- ▶ Diabetisch maculair oedeem
- ▶ Maculair oedeem bij veneuze vaatafsluiting
- ▶ Pathologische myopie

3. HOE VERLOOPT DEZE INGREEP?

Dit is een ambulante ingreep; een opname is hiervoor dus niet nodig en je hoeft niet nuchter te zijn. De injectie gebeurt in een ruimte die speciaal werd ingericht voor kleine ingrepen.

- ▶ Tijdens de behandeling ligt de patiënt neer.
- ▶ De verpleging verdooft het oog met verschillende druppels.
- ▶ De huid rond het oog wordt goed ontsmet met een joodoplossing. Daarna wordt ook het oog zelf hiermee ingedruppeld en wordt een steriel oogdoek over het oog gelegd.
- ▶ De oogarts plaatst daarna een ooglidspeder om de oogleden open te houden waardoor u niet kan knippen. Dit spant een beetje.
- ▶ De oogarts injecteert de medicatie met een speciaal spuitje in de oogbol terwijl de patiënt in een bepaalde richting blijft kijken. Deze prik wordt snel toegediend zodat dit maar heel even voelbaar is. Vaak zien patiënten hierna een wolk of belletjes verschijnen, dat is normaal.
- ▶ Na de prik wordt met een wattenstaafje enkele seconden druk uitgeoefend op de injectieplaats.
- ▶ Het oog wordt daarna grondig gespoeld en er wordt een antibiotische zalf aangebracht.

4. WAT GEBEURT ER NA DE INGREEP?

- ▶ We raden je aan om na de ingreep even te blijven liggen.
- ▶ Na een kwartiertje kan in het oog een zanderig en schurend gevoel ontstaan. Dit kan enkele uren tot een dag (uitzonderlijk enkele dagen) duren en gaat vanzelf over.
- ▶ Op de injectieplaats ter hoogte van het oogbindvlies kan een kleine, onschuldige bloeding optreden. Deze verdwijnt gedurende de eerste week na de ingreep.

5. THUISBEHANDELING

De eerste twee dagen moet je 2 keer per dag een antibiotische zalf in het oog aanbrengen.

Je krijgt kunsttranen mee die je meermaals per dag, in functie van de behoefte, in het oog mag druppelen tot het schurende gevoel voorbij is.

6. OPGELET BIJ VOLGENDE

KLACHTEN

De eerste twee dagen na de ingreep kunnen volgende klachten voorkomen. Neem onmiddellijk contact op met de dienst Oogziekten.

- ▶ Hevige pijn
- ▶ Toenemende vlokken
- ▶ Toenemende roodheid
- ▶ Het zien van bliksems
- ▶ Het zien van een toenemende schaduw

Als de dienst Oogziekten niet bereikbaar is en buiten de werkuren, kan je terecht bij de dienst Spoed (tel. 09 224 81 01).

7. WAT ZIJN DE RISICO'S VAN EEN INTRAVITREALE INJECTIE?

De oogarts neemt alle voorzorgen om de risico's tot een minimum te beperken. Intravitreale injecties worden de laatste jaren wereldwijd heel frequent uitgevoerd en complicaties zijn zeldzaam.